





A nossa visão é um mundo livre de TB onde as famílias estão protegidas e ninguém tem que sofrer o devastador impacto físico, emocional e económico desta doença.

IMPAACT4TB

PREVENIR A TB PARA ACABAR COM A TB



Temos sofrido de Tuberculose (TB) durante muito tempo, uma doença que nos acompanha desde há muitas gerações e que ainda mata 4.000 pessoas por dia.

Ao trabalhar de mãos dadas com os governos, pacientes, médicos, doadores e fabricantes de medicamentos, o consórcio IMPAACT4TB assegura que a procura por terapias salvadoras vidas para a infecção latente por TB seja respondida com um fornecimento efectivo e acessível. Estamos garantindo que todas as pessoas em risco de sofrer TB possam ter um acesso equitativo às melhores formas de prevenir a TB.

Para mais informações, contacte:
impaact4tb@auruminstitute.org

Com o apoio de



Fonte dos dados: Relatório Global da Tuberculose 2017



Aumentando o Mercado e os Resultados de Saúde Pública através da Expansão de Modelos Acessíveis de Terapia Preventiva de Curta Duração para TB

Sabemos como tratar e prevenir a TB há mais de 70 anos; mas ainda mais de 10 milhões de pessoas adoecem com TB em cada ano. A Tuberculose é a doença infecciosa mais mortífera no mundo e ataca principalmente os mais pobres.

Infecção latente por TB: Um terreno fértil para o desenvolvimento da TB

A TB pode ficar adormecida durante décadas antes de atacar; quase uma quarta parte da população mundial é afectada pela infecção latente por TB. As pessoas com infecção latente por TB não apresentam sintomas, não são contagiosas e a maioria não sabe que está infectada embora estejam em risco de desenvolver TB em qualquer momento das suas vidas. Sem o tratamento, entre 5 e 10 por cento das pessoas infectadas, isto é, entre 85 e 170 milhões de pessoas irão desenvolver TB. Alguns grupos específicos são mais susceptíveis a desenvolver a doença activa.

As pessoas que vivem com o HIV, apresentam uma probabilidade 20 a 30 vezes maior de progredir

da infecção latente para a TB activa e morrem em grande número devido à TB. As crianças têm um risco maior de morrer de TB, e àquelas menores de cinco anos de idade têm maior risco de progredir directamente da infecção até à doença activa. Em regiões de alta prevalência, as crianças representam entre 15 e 20 por cento de todos os casos de TB.

A nossa abordagem actual para eliminar a doença tem falhado. Podemos fazer mais e podemos fazê-lo melhor. É altura de mudar o alvo do simples tratamento para a prevenção, pois o único caminho para eliminar a TB vai requerer a construção de uma abordagem para a prevenção mais sólida.

Países que irão receber a terapia preventiva de curta duração



A nossa abordagem para prevenir a TB

- Criar procura para uma terapia preventiva de curta duração
- Assegurar o fornecimento de regimes efectivos de tratamento
- Reduzir o preço da rifapentina para garantir um acesso equitativo
- Melhorar a aceitação nos países com alta prevalência
- Gerar evidências para informar políticas e programas


Deter a TB no seu rasto, ficando um passo à frente da TB

IMPAACT4TB é um projecto de quatro anos que introduz uma nova abordagem para atacar a infecção latente por TB, o viveiro da TB, de maneira a diminuir e finalmente deter a grande quantidade de novos casos de TB que ocorrem a cada ano. Fazemos isto identificando as pessoas com infecção latente por TB e fornecendo novas opções de tratamento de curta duração. O projecto irá priorizar a terapia preventiva de TB de curta duração em pessoas infectadas pelo HIV, em crianças com menos de cinco anos de idade, e em todas as pessoas em contacto próximo com pacientes de TB em 12 países de alta prevalência que representam 50 por cento da carga global de TB.

Ao tratar a infecção latente por TB, podemos impedir que milhares de pessoas desenvolvam a doença activa e definitivamente, salvarmos vidas.

O tratamento da infecção latente por TB está disponível desde a década de 1960, porém apenas algumas pessoas das elegíveis para o tratamento estão a recebê-lo. Actualmente, as opções de tratamento são longas, e as pessoas devem tomar um comprimido cada dia durante 6 a 36 meses. Mesmo entre àqueles que começam o tratamento, muitos não conseguem completá-lo.

Em 2017, apenas 15 dos 30 países com alta prevalência de TB reportaram o uso da opção actualmente recomendada para o tratamento da infecção latente por TB, a Terapia Profiláctica com Isoniazida (TPI).



As terapias preventivas de TB de curta duração tem potencial para mudar as regras do jogo

A evidência demonstra que as terapias preventivas de TB de curta duração são tão efectivas como o tratamento actualmente recomendado para prevenir a progressão para a doença activa. As pessoas que tomam regimes de tratamento mais curtos têm três vezes mais possibilidades de completar o tratamento para a infecção latente por TB do que àqueles que tomam regimes mais longos, o que conduz a melhores resultados e ao salvamento de mais vidas.

3HP é um regime profiláctico para a TB que combina dois fármacos, isoniazida e rifapentina, semanalmente durante três meses. Este regime é fácil de seguir e tem menos efeitos secundários. A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou recentemente normas consolidadas para o tratamento da infecção latente por TB que recomendam o uso de 3HP para pessoas infectadas pelo HIV e contactos de casos de TB de qualquer idade.

As vantagens da 3HP



Mais curto, 3 meses semanalmente, ao contrário de 6 meses diariamente



Menos tóxico



Menos efeitos secundários



Maior adesão